




CYCLOPHOSPHAMIDE - ENDOXAN®

Qu'est-ce que ENDOXAN

Description de la molécule	Description
Cyclophosphamide	Comprimé de 50 mg : blanc, rond 

Comment prendre votre traitement ?

La posologie de votre traitement a été définie par votre médecin.






Dans votre cas, elle est de..... mg / jour, soit comprimé(s) de 50 mg par jour, à prendre le matin, (préciser si à prendre en continu ou non)

A avaler en entier, avec un verre d'eau, sans écraser, couper, croquer, ou diluer les comprimés.

A prendre à heure fixe, le matin à jeun ou pendant le petit-déjeuner

En cas d'oubli ou de vomissements : ne pas prendre de prise supplémentaire, mais attendre la prise suivante.

Posologie - Mode d'administration

une prise par jour, à heure fixe, le matin	  
En continu	
D'autres schémas d'administration existent. Exemple de J1 à J14, reprise à J29	

Comment gérer le stock de votre traitement ?

Ce médicament est disponible en pharmacie de ville.

Son approvisionnement peut nécessiter un délai. Soyez vigilant et anticipez le renouvellement de votre ordonnance.

Conservez ce traitement dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Quelles sont les autres informations à connaître ?

Précautions et surveillance

La prise de votre médicament nécessite une surveillance biologique (prise de sang permettant de surveiller votre



ONCOLIEN de SFPO est mis à disposition selon les termes de la [licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Fondé(e) sur une œuvre à <https://oncolien.sfpo.com>.

Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à <https://www.sfpo.com>

numération de la formule sanguine, votre fonction hépatique et rénale) et clinique (électrocardiogramme) .

Contraception

Ce traitement pourrait être nocif pour un enfant à naître. Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception efficaces (préservatifs et une autre méthode) pendant toute la durée du traitement.

Interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation

La survenue d'interactions entre ENDOXAN[®] et vos autres traitements peut avoir des effets néfastes (diminution de l'efficacité du médicament et de sa tolérance). Il est important d'informer votre pharmacien et votre médecin de l'ensemble des médicaments et/ou autres substances (aliments, plantes, probiotiques, huiles essentielles, compléments alimentaires, etc) que vous consommez.

Exemple : Evitez la consommation de Millepertuis ou de pamplemousse avec l'ENDOXAN[®]

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Les effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessous. D'autres effets indésirables sont possibles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

Effets indésirables	
Les plus fréquents	<p>Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhée, bouche enflammée (aphtes)</p> <p>Anomalie du bilan sanguin : baisse des globules blancs (neutropénie) et anomalies du bilan hépatique</p> <p>Stérilité chez l'homme et chez la femme</p> <p>Autres : fièvre, infection urinaire, sang dans les urines (par irritation de la vessie), chute des cheveux (alopécie)</p>
Quand alerter l'équipe médicale ?	
Alerter l'équipe médicale dans les conditions suivantes et en l'absence de recommandations médicales spécifiques	<p>Troubles digestifs</p> <ul style="list-style-type: none"> > En cas de perte de poids importante et/ou rapide > Diarrhées très fréquentes, plus de 4 selles par jour > Douleurs dans la bouche ou aphtes empêchant une alimentation normale > Douleur intense dans le ventre > Impossibilité de boire pendant 24 h et/ou de manger pendant environ 48h. <p>Symptômes évocateurs d'un trouble rénal</p> <ul style="list-style-type: none"> > sang dans les urines > difficultés à uriner ou absence d'urine <p>Symptômes évocateurs d'une infection</p> <ul style="list-style-type: none"> > température > 38,5 °C > toux, douleur de gorge, douleur pour uriner, diarrhée avec fièvre <p>Symptômes évocateurs d'un trouble au niveau des poumons</p> <ul style="list-style-type: none"> > aggravation d'une toux persistante ou difficulté respiratoire <p>Symptômes évocateurs d'un trouble cardiaque</p> <ul style="list-style-type: none"> > perte de connaissance, palpitations
Comment prévenir les effets indésirables ?	
Hygiène dentaire	<p>Utilisez une brosse à dent souple, réalisez des bains de bouche au bicarbonate de sodium.</p> <p>Evitez les bains de bouche contenant du menthol ou de l'alcool</p>
Infection	<p>Evitez de vous rendre dans les lieux à risque (foule, contact personnes malades...). Une vaccination contre la grippe et le pneumocoque peut vous être recommandée : elle vous protégera</p>
Poids	<p>Surveillez régulièrement votre poids en cas de troubles digestifs.</p>



ONCOLIEN de SFPO est mis à disposition selon les termes de la [licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) .

Fondé(e) sur une œuvre à <https://oncolien.sfpo.com>.

Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à <https://www.sfpo.com>

Stérilité	Informez-vous sur la conservation du sperme et des gamètes avant l'initiation du traitement.
Chute des cheveux	Faites couper vos cheveux. Informez-vous sur les perruques et leur remboursement.
Comment adapter votre alimentation ?	
Nausées	Privilégiez une alimentation fragmentée en plusieurs repas légers, des aliments liquides et froids. Limitez les aliments gras, frits et épicés
Diarrhée	Privilégiez une alimentation pauvre en fibres. Consommez de préférence des féculents, des carottes, des bananes. Évitez de consommer des fruits et légumes crus, des laitages, du café et de l'alcool. Buvez de l'eau de façon abondante
Bouche enflammée (aphtes)	Évitez la consommation d'aliments acides ou qui collent et les aliments très salés.

